

## DATENBLATT

**600 g**  
**(30 Btl. zu 20 g)**

**PZN DE: 0872 8474**  
**PHZNR AT: 575 8291**  
**EAN: 40 2705210 0348**

„Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)“

Zum Diätmanagement  
bei chronischer Niereninsuffizienz  
mit isoliertem protein-wasting.

Renapro® ist eine **phosphat- und kaliumreduziertes Eiweißkonzentrat.**

### Zusammensetzung

	100 g Pulver		100 ml Produkt*	
<b>Energie</b>	<b>1.611</b>	<b>kJ</b>	<b>322</b>	<b>kJ</b>
	<b>385</b>	<b>kcal</b>	<b>77</b>	<b>kcal</b>
<b>Fett</b> - davon	<b>1,0</b>	<b>g</b>	<b>&lt; 0,2</b>	<b>g</b>
gesättigte Fettsäuren	0,6	g	< 0,1	g
<b>Kohlenhydrate</b> - davon	<b>3,4</b>	<b>g</b>	<b>0,7</b>	<b>g</b>
Zucker	< 0,5	g	< 0,1	g
<b>Balaststoffe</b>	<b>0</b>	<b>g</b>		
<b>Protein</b> - davon	<b>90,0</b>	<b>g</b>	<b>18,0</b>	<b>g</b>
Arginin	2,40	g		
Histidin	1,60	g		
Isoleucin	5,10	g		
Leucin	11,60	g		
Lysin	9,10	g		
Methionin	1,90	g		
Phenylalanin	3,10	g		
Threonin	4,30	g		
Tryptophan	1,90	g		
Valin	4,50	g		
<b>ess. Aminosäuren = 51%</b>	<b>45,50</b>	<b>g</b>		
<b>davon verzweigkettige AS</b>	<b>21,20</b>	<b>g</b>		
Alanin	4,60	g		
Asparaginsäure	10,10	g		
Cystein	3,20	g		
Glutaminsäure	14,30	g		
Glycin	1,50	g		
Prolin	3,60	g		
Serin	3,60	g		
Tyrosin	3,40	g		
<b>Nicht ess. As</b>	<b>44,30</b>	<b>g</b>		
<b>Salz</b>	<b>0,8</b>	<b>g</b>	<b>0,15</b>	<b>g</b>
<b>Mineralstoffe</b>				
Natrium	300,0	mg	60,0	mg
<b>Kalium</b>	<b>310,0</b>	<b>mg</b>	<b>62,0</b>	<b>mg</b>
Chlorid	10,0	mg	2,0	mg
Calcium	340,0	mg	68,0	mg
<b>Phosphor</b>	<b>140,0</b>	<b>mg</b>	<b>28,0</b>	<b>mg</b>
Magnesium	40,0	mg	8,0	mg

**Biologische Wertigkeit: 104**  
**Phosphor / Eiweiß-Quotient (PEQ): 1,6**  
**Laktosegehalt: 1,5 g/ 100 g**

\*20 g Pulver + 80 ml Wasser

### Zutaten

**Molkeneiweiß (Milch)**; Emulgator: Sonnenblumen Lecithin; Aroma; Trennmittel: Kieselerde, Süßstoffe: Natriumcyclamat (E952), Natriumsaccharinat (E954); Calciumcarbonat; Magnesiumsalze der Zitronensäure

### Verzehrempfehlung

Nach Anweisung des Arztes, in Abhängigkeit vom Ernährungszustand des Patienten.

Wenn vom Arzt nicht anders verordnet:

**1-2 Beutel täglich**

### Lagerung

Trocken und nicht über Raumtemperatur lagern. Angebrochene Beutel im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen.

Fertige Trinknahrung im Kühlschrank aufbewahren und am gleichen Tag aufbrauchen, ggf. erneut aufschütteln.

### Anwendungshinweise

1 Beutel Renapro® und 80 ml Wasser in einen Schüttelbecher geben und für 10 Sekunden schütteln, bis sich das Pulver vollständig gelöst hat. Alternativ Mixer oder Pürierstab verwenden. Renapro® ist leicht in kaltem und warmem Wasser löslich und zudem koch- und backstabil. Aufgelöst kann es wie Trinkmilch oder Sahne verwendet werden. Zusätzlich kann das Pulver direkt in Speisen wie Quark, Eier, Soßen und Kuchenteig eingerührt oder über Pasta Gerichte gestreut werden.

### Sondennahrung

Renapro® kann über alle üblichen Magensonden appliziert werden. Pulver mit abgekochtem, abgekühltem Wasser aufschütteln, 5 Minuten ruhen lassen, erneut aufschütteln. Auf klümpchenfreie Auflösung achten. Sonde ggf. nachspülen.

Nicht parenteral verwenden.

### Wichtige Hinweise

Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden

Renapro® ist eine ergänzende bilanzierte Diät und kein vollständiges Lebensmittel. Daher ist Renapro® nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet.

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren.

Stand: 06.2024